

MANIPULATIONS OSTÉO-ARTICULAIRES VISCÉRALES

Trouver une colonne vertébrale indemne de fixations est chose rarissime. Penser qu'un blocage articulaire soit uniquement d'origine mécanique est très loin de la réalité.

L'expérience montre qu'il est le plus souvent l'expression d'un problème viscéral ou psychologique. Manipuler immédiatement par « thrust direct » un segment vertébral fixé qui n'est qu'un phénomène de compensation, au mieux ne fera rien, au pire favorisera une décompensation, avec son cortège de douleurs et de limitation articulaire.

La colonne cervicale est l'exemple parfait où un blocage peut provenir d'un problème viscéral, crânien, circulatoire, musculo-ligamentaire, dentaire, dure-mérien.

L'objectif de ce séminaire est d'étudier les nombreux paramètres qui peuvent provoquer une fixation articulaire, aussi au niveau vertébral que périphérique. Le diagnostic se fera grâce aux techniques d'écoute et d'inhibition. Nous verrons aussi comment adapter le meilleur traitement.

Voici le programme des 3 jours

Jour 1

La colonne cervicale

Les différents paramètres pouvant provoquer des fixations ostéo-articulaires :

- le crâne et son contenu
- la dure-mère
- les yeux
- les oreilles
- les sinus (maxillaires, frontaux, sphénoïdiens, ethmoïdiens)
- les glandes salivaires (la parotide)
- la thyroïde

- le système dento-alvéolaire
- le cœur, le péricarde
- la plèvre
- le système neurovasculaire
- le foie et la vésicule biliaire

Jour 2

La colonne thoracique

- les poumons
- les bronches
- la plèvre costale, médiastinale
- le cœur
- l'estomac et le duodénum
- le foie
- les artères et veines pulmonaires
- les seins
- les côtes
- les reins (partie crâniale)

Jour 3

La colonne lombaire

- les reins (partie médiodistale)
- l'uretère
- la vessie et l'utérus
- la prostate
- l'intestin
- le canal inguinal

Les articulations périphériques (entre autres)

- l'épaule
- le coude
- la hanche
- le genou